

## Çocuklarda alerjik olan ilaçlar nelerdir?

İlaç alerjileri aıysından çocukluk ađı eripkinden farklıdır ünkü çocuklarda ilaç alerjisi eripkine gre ok daha az sıklıkta ve karbı grlr. Ancak bilinmelidir ki ilaç alerjisi grlse de reaksiyonları eripkine gre daha az biddetli ve daha az tehlikelidir. ocuk ađıynda en sık grlen ilaç alerjisi, antibiyotiklere, ađrı kesicilere ve bazı protein yapıdaki zel ilalara (insulin, kanser ilaları) karbıdır. Antibiyotikler arasında en sık grlen olmasa da en sık bilineni penisilin alerjisidir. Ancak penisilin korkulduđu kadar sık ve ađrı ilaç alerjisi bulguları yapmaz. Buna karbın penisilinden ok daha sık alerji yapan amoksisilin gibi antibiyotikler vardır. Bunun yanında, aspirin, ibuprofen gibi ađrı kesici-atep dprcler de daha az sıklıkta olmak zere ilaç alerjisi nedenidir. Daha sıklıkta olmakla birlikte çocuklarda kullanılan tm ilaların alerjik reaksiyona yol aabileceđi bilinmelidir. Bazen ise aynı ilacın bir markası kullanıldıđında alerji yapmadıđı halde diđer bir markasını kullandıđında alerji yapabilir. Bu ilaların hazırlanırken kullanılan maddelerine karbı alerji olduđunu gsterir. ođu zaman ilaç alerjileri enfeksiyon zamanında grlen enfeksiyona bađlı deri ve sistem bulguları ile karıyabilir. Bu nedenle bir ilacın kullanıldıđı dönemde oluđturduđu reaksiyonun bu ilaca bađlı bir alerji olup olmadıđına karar verecek olacak kiři ocuk Alerji uzmanı olmalıdır.