

## Ýlaç Alerjisi Bulgularý Nelerdir?

Ýlaç alerjisi bulgularý, ilaç alýndýktan sonra çok kýsa süre içinde veya günler sonra çýkabilir. Çok kýsa süre içinde çýkan (saatler içinde) bulgular genelde aðýr ve hatta hayatý tehdit edici olabilir. Ancak ge çýkan bulgular daha hafiftir. Bu bulgular, aðýr alýnan ilaçlarda daha az ama enjeksiyonlar ile daha fazla görülür. Ýlaç alýndýktan sonra deride kabýntýlý döküntü (ürtiker, kurdeşen) etrafýnda ve göz etrafýnda þiplik (anjioödem), karýn aðrýsý, baþ dönmesi, göđüste sýkýpma, nefes darlýđý hatta bazen bilin bulanýklýđýnýn nedeni tansiyondaki düþmedir. Hayatý tehdit eden birden çok bulgunun görüldüđü sýklýkla nefes alma zorluđu vakanın olan bu tabloya anafilaksi denir. Ancak ilaç alerjisi bulgusu sadece bir deride ürtikerden hayatý tehdit eden anafilaksiye kadar deđiptiđi unutulmamalıdır. Ses tellerinin bulunduđu bölgenin tutuluđu olan laringospazm en önemli ölüm nedenidir. Ancak ilaçların kullanýldýđý dönemdeki örneđin bir enfeksiyon döneminde kullanýlan antibiyotik ile çýkan döküntü veya benzeri bulgular deđil enfeksiyona bađlý olabilir. Bazen yanlýþlýkla ilaç alerjisi olarak algýlanan bu durum ilacýn kesilmesi ile enfeksiyonun hayatý tehdit etmesine yol açabilir. Bu nedenle bulgularýn ilaç alerjisine bađlý olup olmadýđý konusunda Çocuk Alerji uzmanýna danýþýlmalıdır.