

Ýlaç alerjisinin Tedavisi

Ýlaç alerjisi bulgularý ile gelen çocukta bu bulgularý ortadan kaldýracak antialerjik tedavi yapýlmalý, taný için gerekli iþlemler tamamlanmalýdýr. Gerçekten reaksiyon gösterilen ilaçtan alerjik olduðu þüpheleniliyorsa gerekmedikçe bu ilaç kullanýlmamalý ve her zaman alternatif ilaç önerisinde bulunulmalýdýr. Çocuðun bu ilaca alerjik olduðu aileye bildirilmeli, dosyasýnýn üzerine yazýlmalý ve her zaman bir saðlýk kurulupuna bapvurusunda belirtmek üzere eline bir belge verilmelidir. Bazý ilaçlar, sadece kendileri deðil ona benzeyen ilaçlarýn da alerjisi ile birlikte olabilir. Örneðin, penisilin alerjisi olan bir çocukta ampisilin alerjisi de oldukça sýktýr. Bu nedenle, yandaðı alerjiler konusunda aileye bilgi verilmelidir. Eðer alerjik olan ilaç kullanýlmadýðý durumda hayatý tehdit edici bir enfeksiyon ya da hastalýk olacaksa Çocuk Alerji uzmanýnýn kontrolünde o ilaca karþý hýzly duyarsýzlaþtırma programý uygulanmalýdýr. Anafilakside bulgularý olan olgularda bu bulgularýn olmasý durumunda kullanýlacak acil ilaçlar hastanýn yanýnda bulundurulmalýdýr. Bir ilaca karþý alerjisi olan çocuðun hayatýnýn ilerleyen dönemlerinde bir baþka ilaca karþý da alerjisinin olabileceði aileye hatýrlatýlmalýdır. Astým ya da alerjik rinit gibi hastalýðý olan çocuklarda ilaç alerjisi sýklýðýnýn normalden daha yüksek olmadýðý ancak bulgularýn olduðu bilinmelidir.