

Alerjik Çocuk Büyüyünce Ne olur?

Eđer alerjik çocuk bir çocuk alerji uzmaný tarafından iyi tedavi edilmiþ ve izlenmiþ ise büyüdüünde O’ nu bekleyen bir hemen hemen yoktur. Ancak koruyucu önlemler alınmak þartýyla. Ama tedavi edilmeyen bir çocuk için gerçekten önemli komplikasyon ve hastalýklar vardýr. Bu beklentide çocuðun sahip olduðu alerjik hastalýk önemlidir. Örneðin tedavi edilmemiþ bir bebeklik egzemasý bulgularý bir süre sonra azalýr ama bu çocuk için astým ve saman nezlesi çok yüksek oranda görülen eriþkin hastalýðýdır. Saman nezlesi olan bir çocuk için tedavi edilmediði takdirde % 70 oranýnda ortalama astým riski vardýr. Astýmlý çocuk ise bu çok daha dramatikdir. Astým ilk 7 yaþta taný konulmalı ve tedavi edilmelidir. Tedavi edilmeyen astýmlý bir çocuk için 7-10 yaþlarında azalan bulgular iyileþti diye yanlýþ hissedilebilir. Ancak ergenlikle birlikte astým bulgularý daha ađýr þeklide geriye döner. Hatta eriþkindeki kronik bronþitli KOAH denilen solunum yetmezliðine giden hastaların çoðunun çocukluk çaðýnda tedavi edilme astým yada benzeri hastalýk olduðu öner sürülmektedir. Tabii ki tedavi edipmiþ bir alerjik hastalýk bulgusu eđer çevresel risk varsa geriye dönebilir. Örneðin astýmlý bir çocuk tedavi edilip bulgular kaybýlmuþ ama eriþkin dönemde sigara içmeye baþlamýþ tablosu geriye döner. Ancak daha önce bahsedilen (bkz Alerjik hastalýklardan korunma) koruyucu önlemler alınýrsa astýmlý bir çocuk 2002 yýlý olimpiyat 1000 metre koþu þampiyonasýnda olduðu gibi baþarýlý bir sporcu da olabilir.